Nachdruck verboten.
Übersetzungsrecht vorbehalten.

4. Anthomyiinae.

Bearbeitet von

Prof. **P. Stein,** Treptow a. Rega.

---

1. ***Phaonia incana*** Wied. Hansen, Faunula, p. 262.

Hoyvig, Wiese, 2./9., 1 ♀.

2. ****Trichopticus rostratus*** Meade.

Thorshavn, Weg nach Hoyvig, 31./7., 1 ♂; Thorshavn, Steinwall, 4./8., 1 ♂, 1 ♀.

3. ***Trichopticus variabilis*** Fall. Hansen, Faunula, p. 262.

Eide, Wasserwerk, 12./8., 8 ♀♂; Eide, auf Blüten, 12./8., 1 ♀; Kvalvig, Wiese, 16./8., 1 ♀.

4. ****Hebecnema umbratica*** Mg.

Sand, auf Wiese, 31./8., 1 ♂.

5. ****Mydaea lucorum*** Fall.

Sand, auf Blüten, 20./8., 1 ♀.

6. **Mydaea (Myiospila) meditabunda* Fb.

Sand, 3./8., 1 ♂; Eide, Wasserwerk, 12./8, 1 ♀; Eide, am Weg, 12./8., 1 ♂; Kvalvig, Wiese, 17./8., 2 ♂♂, 2 ♀♀; Sand, 30./8., 1 ♀; Sand, auf Angelica, 31./8., 1 ♂; Midvaag, Friedhof, 2./9., 1 ♂; Kvalvig, Uferwiese, 11./9., 1 ♂; Sand, auf Strandhafer, 26./9., 2 ♂♂.

7. **Mydaea duplaris* Ztt. Mde.? (ist vielleicht *duplicata* Mcq.).

Hoyvig, Wiese, 2./9., 2 ♀♀.

8. **Hydrotaea dentipes* Fb.

Eide, Wasserwerk, 12./8., 1 ♀; Sand, blumige Wiese, 27./8., 1 ♂; Sand, auf Angelica-Blüten, 30./8., 1 ♀; Sand, auf Angelica-Blüten, 31./8., 4 ♀♀; Midvaag, Garten, 4./9., 2 ♂♂; Thorshavn, Friedhof 18./9., 1 ♂.

9. **Fannia scalaris* Fb.

Thorshavn, Garten. 20./3., 2 ♂♂.

10. **Fannia canicularis* L.

Thorshavn, Wiese, 25./8., 1 ♂.

11. **Fannia mutica* Ztt.

Hoyvig, auf Blumen, 1./8., 1 ♂; Hoyvigsholm, 2./8., 1 ♀; Hoyvig, 2./8., 1 ♀; Eide, am Weg, 12./8., 1 ♀; Langesand, Wiese, 16./8., 1 ♀; Saxental, 10./9., 1 ♀.

12. **Fannia serena* Fall.

Sand, Wiese, 31./8., 1 ♀.

13. *Coelomyia spathulata* Ztt. Hansen, Faunula, p. 263.

Hoyvig, Wiese, 2./8., 4 ♀♀; Thorshavn, in Ranunculus-Blüten. 4./8., 2 ♀♀.

14. *Axelia triquetra* Wied. Hansen, Faunula, p. 263.

Midvaag, Friedhof, 2./9., 1 ♀.

15. **Hylemyia cardui* Mg. (oder *brunnescens* Ztt.?).

Hoyvig, auf Blumen, 1./8., 1 ♀; Eide, am Weg, 12./8., 2 ♀♀.

16. **Hylemyia (Chortophila) nuda* Strobl.

Kvalvig, Wiese, 7./8., 1 ♀; Langesand, an Aasköder, 15./8., 1 ♀.

17. **Chortophila fugax* Mg.

Thorshavn, Ufer, 3./8., 1 ♀; Hoyvig, Wiese, 2./9., 2 ♂♂; Saxental, 10./9., 1 ♂; Sand, Berghang, 26./8., 1 ♀.

18. **Chortophila dissecta* Mg.

Thorshavn, nachts im Ufergrase gekeschert, 3./8., 1 ♀; Thorshavn, 3./8., 1 ♂, 1 ♀; Rasenhöhen am Eidesee, 10./8., 1 ♀; Eide, 12./8., 2 ♀♀; Kvalvig, Wiese, 17./8., 2 ♀♀; Naalsö, Heide, 19./8., 2 ♀♀; Sand, auf Angelica-Blüten, 26./8., 2 ♂♂; Sand, auf Achillea-Blüten, 30./8., 7 ♀♀, 1 ♂; Sand, Wiese, 31./8., 3 ♀♀; Midvaag, Friedhof, 2./9., 1 ♂, 1 ♀; Thorshavn, Friedhof, 18./9., 1 ♀; Thorshavn, Heide, 18./9., 1 ♂. Fraglich zu *dissecta* gehörig: Thorshavn, Steinwall, 4./8., 1 ♀; Hoyvig, Wiese, 2./9., 1 ♀.

19. **Calliophrys riparia* Fall.

Midvaag, Bordalafoss, 2./9., 7 ♀♀, 1 ♂; Saxental, 10./9., 1 ♀; Frodebö, Wasserfall, 14./9., 1 ♀.

20. ***Pegomyia bicolor*** Wied.

Eide, am Weg, 12./8., 1 ♀; Midvaag, 2./9., 1 ♂.

21. ***Hoplogaster mollicula*** Fall. Hansen, Faunula, p. 263.

Meist mit dunklen Tastern und Fühlern!

Hoyvig, auf Blumen, 1./8., 1 ♂; Hoyvig, Wiese, 2./8., 1 ♀, 1 ♂; Thorshavn, Ufer, 3./8., 10 ♀♀; Thorshavn, an Steinwällen, 6./8., 1 ♀; Eide, am Weg zum Slættaratindur, 12./8., 5 ♀♀, 1 ♂; Langesand, Wiese, 16./8., 5 ♀♀; Langesand, Ufer, 15./8., 1 ♀; Kvalvig, Wiese, 17./8., 4 ♀♀; Thorshavn, Wiese, 25./8., 1 ♂; Hoyvig, Wiese, 2./9., 1 ♂.

22. **Coenosia pumila* Fall.

Hoyvig, Wiese, 2./8., 1 ♀; Thorshavn, Ufer, 3./8., 1 ♀; Slættaratindur, 12./8., 7 ♀♀; Sand, Heide, 26./8., 1 ♀; Eide, 12./8., 4 ♀♀; Hoyvig, auf Blumen, 1./9., 1 ♀.

23. **Coenosia albatella* Ztt.

Sand, 30./8., 1 ♀.

24. **Schoenomyza litorella* Fall.

Thorshavn, Anfang August, 1 ♀.

25. ***Fucellia fucorum*** Fall. Hansen, Faunula, p. 263.

Thorshavn, Steinwall, 4./8., 1 ♂; Sand, Dünen, 26./8., 1 ♂, 1 ♀; Midvaag, am Friedhof, 2./9., 1 ♂, 2 ♀♀.

Tachinidae (Calliphorinae).

1. ***Calliphora erythrocephala*** Mg.

Thorshavn, Ufer, 3./8., 1 ♂, 1 ♀; Eide, Wasserwerk, 12./8., 3 ♂♂, 1 ♀; Thorshavn, Garten, 20./8., 1 ♂, 1 ♀; Sand, auf Angelica-Blüten, 31./8., 2 ♀♀; Hoyvig, 2./9., 1 ♂.

Übersicht
der in vorstehendem Verzeichnis **nicht** angeführten, von den Færöern bisher bekannten Dipteren.

Abkürzungen:

H 271 = Hansen, Faunula Insectorum Faeroeensis, 271.
A. F. Z. 20 = in: Ark. Zool. Vol. 8 No. 12, p. 20.

Lycoria (Sciara) carbonaria Mg. H. 271
— — *fucata* Mg. H. 271
— — *pulicaria* Mg.? H. 271
Lasiosoma hirtum Mg. H. 271
Philia (Dilophus) femorata Mg. H. 270
Bibio pomonae Fb. H. 270
— *lacteipennis* Ztt. H. 270
Helea (Ceratopogon) leucopeza Mg. (= *niveipennis* Mg.) H. 274
Tendipes (Chironomus) niger Hansen. H. 274, 12 Expl. 10 ♂♂, 2 ♀♀.

Thorax niger, nitidus; discus pilis in series tres rectas, intermediis ante decurtatis, dispositis ornatus; antennae et palpi nigro-fusci; abdomen nigro-brunneum, fusco-pilosum; pedes obscure brunneo-testacei sive brunneo-fusci; metatarsi primi paris (quam tibiae tertia quartave parte longiores; pedes antici in utroque sexu toti breviter pilosi; pedes posteriores longius pilosi Alae cinereo-albidae, totae sat dense pilosae, immaculatae. Long. mar. 4,5 mm, fem. 3,5 mm. (Hansen.)

Tendipes (*Chironomus*) *dispar* Mg. (= *lucens* Ztt.). H. 274 u. 275. 5 Expl. 3 ♂♂, 2 ♀♀.

Das ♀ von Hansen neu beschrieben:

Femina (*non descripta*) *mari similis, sed differt colore dilutiore. Thorax nitidus, flavus; dorsum striis tribus nigris, latis, maxime approximatis et post confluentibus; lateralibus ante decurtatis; latera thoracis superne flava, fusco-maculata; deorsum nigra. Scutellum et metanotum nigra, nitida. Abdomen nigro-brunneum; pedes brunnei; femora basi dilutiora. Alae albae, strigula basali fusca.* (*Mas etiam ante in lateribus thoracis vestigio coloris flavi.*) *Long. mar. 5 mm, fem. 3—4 mm.* (Hansen.)

Metriocnemus (*Chironomus*) *fuscipes* Mg. H. 275
Orthocladius (*Chironomus*) *sordidellus* Ztt. (= *variabilis* Stgr.) H. 275
Diamesa notota Stgr. H. 275
Pelopia (*Tanypus*) *sp.?* H. 276
Psychoda phalaenoides L. H. 276
Itonida (*Cecidomyia*) *sp.?* (*C. nigricolli* Mg.? aff.) H. 271
Limnophila nemoralis Mg. H. 274
Amalopis (*Tricyphona*) *immaculata* Mg. H. 273
Tipula fulvipennis Deg. (= *lutescens* Fb.) H. 272
— *rufina* Mg. (= *parvicauda* Hansen!) H. 272
— *subnodicornis* Ztt. H. 272
— *fulvipennis* Deg. A. F. Z. 20
— *lateralis* Mg. A. F. Z. 21
— *oleracea* L. A. F. Z. 21. — Entomologist Vol. 23 p. 377 (1890).
— *lunata* L. — Entomologist, Vol. 23, p. 377 (1890).
Empis lucida Ztt. A. F. Z. 17
Hilara chorica Fll. H. 260
Atalanta s. str. (*Clinocera.*) *appendiculata* Ztt. H. 259
Dolichopus planitarsis Fll. H. 260
Hydrophorus bisetus Lw. (= *inaequalipes* Mcq. H. 260
Platychirus clypeatus Mg. H. 261
Eristalis nemorum L. H. 261
Cinxia (*Sericomyia*) *lappona* L. H. 261. — A. F. Z. 18
Phora nigricornis Egg. H. 270
Mydaea (*Spilogaster*) *anceps* Ztt. H. 262
Limnophora sp.? H. 263.
Chortophila (*Homalomyia*) *lepida* Fll. H. 263
Scopeuma (*Scatophaga*) *litorea* Fll. H. 264
— — *villipes* Ztt. H. 264, 7 ♀♀, 10 ♂♂.

Da Becker, Scatomyzidae, in: Berlin. entomol. Ztg., Vol. 39, 1894, p. 173 sagt: „Das Weibchen ist bislang nicht bekannt", sei hier Hansen's Beschreibung desselben wiederholt:

Femina: *Abdomen supra non villosum, pilis sive setulis brevibus et praeterea setulis perpaucis sat longis vestitum, subtus non longe villosum;*

pedes pilis sive setulis vestiti; coxae et basis femorum subtus sat breviter villosa; tibiae ut apud marem spinulosae (tibiae maris quattuor posteriores circum apicem et praeterea tibiae intermediae ad apicem versus spinulis pluribus armatae) posticae in latere posteriore praeterea seriebus duabus spinularum longiorum armatae. (Hansen.)

Olina (*Borborus*) *geniculatus* Mcq. H. 268. — A. F. Z. 19
Borborus nitidus Mg. H. 268
— *sp.?* A. F. Z. 19
Limosina sp.♀. H. 270
Dictya (*Tetanocera*) *umbrarum* L. H. 266
Themira putris L. H. 266
— *minor* Hal. H. 266
Notiphila cinerea Fll. H. 266
Hydrellia modesta Lw. H. 267
Parydra pusilla Mg. H. 267
Scatella sibilans Hal. H. 267
— *stagnalis* Fll. H. 267
Neoalticomerus formosus Lw. = *Ochthiphila litorella* Fll. H. 268
Agromyza vagans Fll. H. 268

G. Pätz'sche Buchdr. Lippert & Co. G. m. b. H., Naumburg a. d. S.